

VACUNA BioNTech- PFIZER

APLICACIÓN DE LA VACUNA

Usted recibirá las vacunas y kits que incluyen el equipo necesario para prepararlas y aplicarlas

- Diluyente estéril
- Agujas y jeringuillas para diluir
- Agujas y jeringuillas para aplicar
- Pads de alcohol estériles
- Equipo de protección personal
- Tarjetas de vacunación

Siempre revise la fecha límite de uso de la vacuna y los registros de temperatura ANTES de diluir y aplicar la vacuna. NO diluya NI aplique vacunas después de la fecha límite o que hayan estado por fuera del rango adecuado de temperatura

Administración

- ✓ Use siempre equipo de protección personal (EPP) para aplicar la vacuna (guantes, mascarilla quirúrgica o N95 y protección ocular)
- ✓ Cambie el EPP si se contamina. Siempre siga las indicaciones de su institución para uso de EPP

Una vez usted tenga la vacuna diluída y lista para aplicar (ver instrucciones de preparación en hoja anexa):

1

- ✓ Escoja la aguja adecuada para la aplicación (22-25, 1-1.5")
16-18 años: 1" >18 años: depende de sexo y peso
- ✓ Use una **aguja y una jeringuilla nueva y estéril** para cada aplicación
- ✓ Solo aplique las vacunas en el área designada para ese fin
- ✓ Asegúrese que tiene la información y documentos correctos del paciente, que se hizo screening de contraindicaciones para vacunación y que el **paciente firmó el consentimiento informado**

2

- ✓ Limpie con un pad de alcohol estéril la tapa del frasco de vacuna diluída
- ✓ Con la jeringuilla y aguja escogidas para la aplicación, retire **0.3 mL** del frasco de vacuna diluída
- ✓ Para evitar pérdida de vacuna, remueva burbujas de aire con la aguja todavía insertada en el frasco
- ✓ Asegúrese que la jeringuilla no está fría al tacto



3

- ✓ Limpie el área de aplicación (músculo deltoide del brazo) con un pad de alcohol estéril
- ✓ De ser posible, aplique en el brazo no dominante
- ✓ Explique al paciente el procedimiento que va a realizar
- ✓ Aplique la vacuna como inyección intramuscular
- ✓ Use la misma aguja para extraer la vacuna del frasco y para aplicarla (cámbiela si se daña o contamina)

4

- ✓ Recuérdele al paciente los posibles efectos secundarios más comunes
- ✓ Pregunte al paciente cómo se siente y diríjalo al área de espera post-vacunación
 - ✓ Entregue la hoja informativa post-vacunación
 - ✓ Diligencie la tarjeta de vacunación y entréguela al paciente
- ✓ Informe claramente al paciente si ya completó la serie de vacunas (2da dosis) o si debe regresar y cuándo (1ª dosis)



La vacuna diluída es de color blanco

Recuerde revisar la fecha y hora en la que se diluyó la vacuna
La vacuna **diluída debe usarse en las siguientes 6 horas** (mantenerse 2°C a 25°C)
Descarte la vacuna diluída luego de 6 h.
NO ponga la vacuna diluída en la nevera o el congelador.