

VACUNA BioNTech- PFIZER

Hospitales CON Capacidad de Almacenamiento de Vacunas en Congelador Ultrafrío

Neveras de transporte



- Especialmente diseñadas, se utilizan para transporte aéreo hacia Puerto Rico y para transporte terrestre hacia ciertos centros de vacunación
- Mantienen temperaturas de $-70^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ por hasta 10 días (sin abrir)

En esta nevera se recibirán las vacunas en su hospital/centro de vacunación

Desempaque

- Asegúrese de hacerlo en un lugar bien ventilado
- Use guantes térmicos
- Corte la cinta en el exterior de la caja
- En el monitor de temperatura que verá en la tapa de espuma, presione el botón de “stop” por 5 segundos
- Abra la tapa de espuma, usando los tres agujeros (1)
- Saque el empaque de hielo seco
- Remueva la “Payload Box” halando las manijas hacia arriba (2)
- Almacene las bandejas **inmediatamente** según su disponibilidad
- Recuerde, **no abra las bandejas** hasta que no las vaya a descongelar



Almacenamiento

Una vez abierta la nevera de transporte, hay dos opciones de almacenamiento:

Congelador ultrafrío (-60°C a -80°C)

Mantiene la vacuna hasta por **6 meses**



Las bandejas con **tapa cerrada** (195 frascos) pueden estar a T° ambiente ($<25^{\circ}\text{C}$) hasta por **5 min** durante la transferencia

Las bandejas con **tapa abierta** (menos de 195 frascos) pueden estar a T° ambiente hasta por **3 min** durante la transferencia

Cuando las bandejas se han expuesto a temperatura ambiente, **deben** permanecer en el congelador por al menos **2 horas** antes de que se puedan sacar de nuevo

Nevera (2 a 8°C)

Mantiene la vacuna (**sin diluir**) hasta por **5 días**

Una vez guardadas a $2-8^{\circ}\text{C}$, no se pueden recongelar



La nevera puede usarse para descongelar la vacuna. Una bandeja de 195 frascos toma de 2 a 3 h en descongelarse

Si necesita **descongelar** la vacuna para uso inmediato, puede hacerlo a T° ambiente ($<25^{\circ}\text{C}$) por **30 min**. Una vez descongelada, **dilúyala en máximo 2 horas**

NO deje la vacuna a T° ambiente por mas de 2 horas

La vacuna **diluída debe usarse en las siguientes 6 horas** y mantenerse entre 2°C a 25°C

Si remueve un frasco individual de una bandeja, a T° ambiente, no se debe recongelar sino descongelar para usarlo