



DEPARTAMENTO DE SALUD

Recomendaciones para las personas vacunadas fuera de los Estados Unidos

Las siguientes vacunas han sido autorizadas por la OMS. Las personas que han sido vacunados parcialmente o han completado la serie primaria pueden completar la vacunación en PR y son elegibles para un refuerzo bivalente.

1. Sinovac (CoronaVac)– 0.5ml x 2 dosis, 2da dosis en 14-28 días
2. Sinopharm (Covilo, BBIBP-CorV)- 0.5ml x2; 2da dosis en 21-28 días
3. AstraZeneca (AZD1222, Vaxzevria)- 0.5ml x2; 2da dosis en 4-12 semanas
4. Pfizer (BNT162b2/Comirnaty, Tozinameran {INN})- 0.3ml x 2; 2da dosis en 21-28 días
5. Moderna (mRNA-1273, Spikevax)- 0.5ml x 2; 2da dosis en 28 días
6. Janssen(Johnson & Johnson) (Ad26.COV2.5)- 0.5ml – dosis única
7. Bharat Biotech India (COVAXIN)- 0.5ml x2, 2da dosis en 28 días
8. Novavax – (NVX-CoV2373, Nuvaxovid)- 0.5ml x2, 2da dosis en 21-28 días
9. Serum Institute of India (COVISHIELD)- 0.5ml x2, 2da dosis en 4-12 semanas
10. Serum Institute of India (NVX-CoV2373, Covovax)- 0.5ml x2, 2da dosis en 21-28 días
11. CanSinoBio (Ad5-nCoV) – 0.5ml- dosis única

Las recomendaciones clínicas para las personas vacunadas fuera de los Estados Unidos son las siguientes:

RECIBIO UNA VACUNA COVID-19 AUTORIZADA POR LA FDA

| Historial de Vacunación | Acciones Recomendadas |
|--|---|
| Recibió una o más dosis de vacuna ARNm monovalente | Administre una dosis bivalente ARNm. Las personas de 6 meses en adelante deben recibir al menos una dosis bivalente ARNm apropiada para la edad al menos 2 meses luego de su última dosis de vacuna monovalente. |
| Recibió 1 o 2 dosis de vacuna Novavax | Administre una dosis bivalente ARNm. |
| Recibió una dosis bivalente ARNm | No repita. Las personas ≥ 65 años tienen la opción de recibir una dosis adicional de vacuna bivalente al menos 4 meses luego de la primera dosis de vacuna bivalente. |

RECIBIO UNA VACUNA COVID-19 DE LA LISTA DE USO DE EMERGENICA DE LA OMS PERO NO AUTORIZADA POR LA FDA

| Historial de Vacunación | Acciones Recomendadas |
|--|---|
| Recibió todas las dosis de serie primaria recomendadas para la vacuna. | Administre una dosis bivalente ARNm. |
| Recibió una serie primaria parcial para la vacuna. | Administre una dosis bivalente ARNm. Las personas de 6 meses en adelante deben recibir al menos una dosis bivalente ARNm apropiada para la edad al menos 2 meses luego de su última dosis de vacuna monovalente. |
| Recibió una dosis de refuerzo monovalente luego de completar la serie primaria. | Administre una dosis bivalente ARNm. |
| Recibió una dosis de vacuna bivalente ARNm luego de completar la serie primaria. | No repita. Las personas ≥ 65 años tienen la opción de recibir una dosis adicional de vacuna bivalente al menos 4 meses luego de la primera dosis de vacuna bivalente. |

RECIBIO TODAS O ALGUNAS DE LAS DOSIS RECOMENDADAS DE VACUNAS COVID-19 QUE NO ESTAN AUTORIZADAS POR LA FDA O EN LA LISTA DE USO DE EMERGENCIA DE LA OMS

| Historial de vacunación | Acciones Recomendadas |
|---|--|
| Recibió cualquier número o combinación de dosis de vacunas. | No cuente las dosis recibidas para la vacunación en los EU. Vacune de acuerdo al itinerario de los EU. Comience la vacunación al menos 28 días luego de la última dosis de vacuna. |

RECOMENDACIONES VACUNADOS EN ESTUDIOS CLÍNICOS

- **Los participantes de estudios clínicos en los Estados Unidos al igual que los participantes del mismo estudio clínico fuera de los Estados Unidos que recibieron todas las dosis de serie primaria de una vacuna que no está listada para uso de emergencia por la OMS pero que su eficacia ha sido confirmada independientemente por una junta de monitoreo de datos y seguridad de los Estados Unidos o su equivalente, están al día con sus vacunas COVID-19 cuando reciben una dosis de vacuna bivalente ARNm.**
- **En este momento solo la vacuna Medicago COVID-19 en personas de 18 años o más y la vacuna Sanofi-GSK COVID-19 en personas de 18-59 años cumplen este criterio.**

Revisado 1 de mayo de 2023.