

DEPARTAMENTO DE
SALUD



COVID-19 Vaccination Office Hours

Programa de Vacunación
Departamento de Salud
martes, 1 de junio de 2021

Recordatorios generales

DEPARTAMENTO DE
SALUD



- Los proveedores que reciban Moderna sepan que el frasco en adelante vendrá de 14 dosis (no 10).
- Si le sobran vacunas por la reducción en demanda, favor notificar con al menos 7 días de anticipación a la fecha en que se cumplen los 30 días de almacenamiento en nevera.
- Antes de desechar las vacunas con más de 30 días en nevera, favor consultar con el personal regional. Mientras espera por instrucciones, favor rotular las vacunas como “No utilizar hasta recibir instrucciones. Vacunas con fecha de expiración _____”. Mantenga estas vacunas en la unidad de almacenamiento hasta recibir instrucciones.
- Favor descartar vacunas expiradas de sus unidades de almacenamiento, conforme a las normas locales y estatales.



Recordatorios generales

DEPARTAMENTO DE
SALUD



- Quienes han solicitado el recogido de vacunas Janssen, agradeceremos sean pacientes. Son muchas vacunas a recoger y los recursos son limitados.
- Todo proveedor que devuelva vacunas, debe también devolver los kits ancilares.
- No pueden coordinar actividades de vacunación hasta tanto no le confirmemos cuántas vacunas le llegarán y cuando se las entregarán.



Baja acuerdo proveedores

DEPARTAMENTO DE
SALUD



- Si usted ya no desea recibir vacunas COVID-19, favor comunicarse con el personal regional para solicitar una baja del sistema.
- Si en el futuro desea volver a vacunar contra COVID-19, puede solicitarlo al personal regional. El proceso será más sencillo porque su cuenta (pin) ha sido creado anteriormente.
- Mantener su cuenta activa, si ya no desea vacunar, afecta los datos que se utilizan para planificar, asignar recursos y reportar progreso.



Actualización AUE Pfizer-BioNTech

DEPARTAMENTO DE
SALUD



- El 19 de mayo de 2021 la FDA actualizó la hoja informativa para proveedores de la vacuna Pfizer-BioNTech.
- La FDA establece que los frascos no diluidos de la vacuna de Pfizer-BioNTech pueden mantenerse en nevera de 2-8°C por 1 mes.
- El proceso de dilución de la vacuna sigue siendo el mismo, al igual que el tiempo de duración de la vacuna luego de dilución (6 horas).
- Recuerde que un frasco contiene 6 dosis de 0.3ml.
- Reporte cualquier evento adverso relacionado con la vacuna a <https://vaers.hhs.gov/reportevent.html>



Actualización Miocarditis/Pericarditis

DEPARTAMENTO DE
SALUD



- CDC publicó el 27 de mayo de 2021 una actualización sobre los casos reportados de miocarditis/pericarditis. Más de 165 millones de personas en Estados Unidos han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19; CDC sigue monitoreando la seguridad de estas vacunas.
- Desde abril 2021 ha habido un aumento en las notificaciones de casos de inflamación cardíaca (miocarditis/pericarditis) en VAERS, en personas que recibieron la vacuna ARNm contra el COVID-19. Estas notificaciones son infrecuentes dada la cantidad de dosis de vacunas administradas.
- CDC está monitoreando estas notificaciones para obtener mas información sobre lo sucedido y ver si existe alguna relación con la vacunación contra el COVID-19.



Actualización Miocarditis/Pericarditis

DEPARTAMENTO DE
SALUD



- La mayoría de los pacientes que recibieron atención respondieron bien al tratamiento con medicamentos, y al reposo se sintieron mejor.
- Los casos notificados en VAERS corresponden principalmente a varones adolescentes y adultos jóvenes de 16 años de edad o más.
- Los casos fueron más frecuentes después de la segunda dosis de una de estas dos vacunas (Pfizer-BioNTech y Moderna), y por lo general se presentaron varios días después de la vacunación contra el COVID-19.
- Una vez mejoran sus síntomas, por lo general pueden reanudar sus actividades habituales de vida diaria y deben consultar con sus médicos acerca de reanudar ejercitación o actividades deportivas.
- CDC sigue recomendando la vacunación contra el COVID-19 para todas las personas de 12 años en adelante. Los beneficios conocidos y potenciales de la vacunación contra el COVID-19 superan los riesgos conocidos y potenciales, incluido el posible riesgo de miocarditis/pericarditis.



Recomendaciones para el personal clínico

DEPARTAMENTO DE
SALUD



- CDC continua recomendando la vacunación contra el COVID-19 para personas de 12 años en adelante dado al riesgo alto de otras complicaciones serias relacionadas al COVID-19 como lo son hospitalizaciones, MIS-C o la muerte.
- Considere el diagnóstico de miocarditis y pericarditis en adolescentes y adultos jóvenes con dolor de pecho agudo, falta de aire, o palpitaciones.
- Si identifica estos síntomas, pregunte si el paciente se ha vacunado contra el COVID-19 al igual que cualquier otra información médica, de viaje o social.



Recomendaciones para el personal clínico

DEPARTAMENTO DE
SALUD



- Considere un ECG, niveles de troponina, marcadores inflamatorios como CRP y Sed Rate como evaluación inicial. Si estos valores están normales es poco probable que el paciente tenga miocarditis/pericarditis.
- Considere una consulta con cardiología para asistencia en la evaluación y el manejo de estos pacientes. La evaluación y el manejo van a depender de la edad del paciente, la presentación clínica, causas potenciales o la preferencia del proveedor.
- Es importante descartar otras causas de miocarditis/pericarditis incluyendo infección por SARS-CoV-2 (PCR), infección previa por SARS-CoV-2 (anticuerpos contra la nucleocapsida) y otras etiologías virales (enterovirus PCR, pruebas de patógenos respiratorios).
- Para el seguimiento de estos pacientes, consulte las recomendaciones de la Sociedad Americana del Corazón (AHA) y del Colegio Americano de Cardiología (ACC).



¿Cuanto duran las vacunas Janssen en nevera de 2-8°C?

DEPARTAMENTO DE
SALUD



- La vacuna Janssen **puede ser almacenada en nevera de 2-8° hasta la fecha de expiración.**

How to Store the Janssen COVID-19 Vaccine

Storing in a Refrigerator

- Vaccine vials may be stored in the refrigerator between 2°C and 8°C (36°F and 46°F) until the expiration date before vials are punctured.
 - As the expiration date approaches, check the expiration date again.
 - Scan the QR code located on the outer carton, or
 - Call 1-800-565-4008, or
 - Go to [www.vaxcheck.jnjexternal icon](https://www.vaxcheck.jnjexternalicon)
 - Use CDC's expiration date tracking tool to document expiration date changes.
- After puncturing the multidose vial seal, store vaccine in the refrigerator between 2°C and 8°C (36°F and 46°F) for up to 6 hours or at room temperature (up to 25°C/77°F) for 2 hours.

- Para mayor información, favor acceder a:

<https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/janssen/index.html>





¿Preguntas?

Acceda a esta y pasadas presentaciones de los *COVID-19 Vaccination Office Hours* en el siguiente enlace: <https://www.vacunatepr.com/new-pagecovid-19-vaccination-office>

Directorio Programa de Vacunación – Nivel Central



Área	Nombre	Teléfono	Correo electrónico
Encuesta SurveyMonkey Directorio de proveedores	Sr. Julián Cordero	787-765-2929 x.3348	julian.cordero@salud.pr.gov
Acuerdos de proveedores	Sr. Jesús Alvarado	787-765-2929 x.3334	acuerdos covid19@salud.pr.gov
Adiestramientos	Sr. Héctor Robles	787-486-8008	hector.robles.garcia@salud.pr.gov
Administración de vacunas	Sr. Ángel Martínez	787-765-2929 x.3345	angle.martinezr@salud.pr.gov
Consultas clínicas	Dra. Lourdes Pedraza	787-765-2929 x.3316, 3317, 3318	lourdes.pedraza@salud.pr.gov
Manejo y almacenamiento de vacunas	Sra. Gladys Ayala		gladys.ayala@salud.pr.gov
Puerto Rico Electronic Immunization System (PREIS)	Sr. Carlos González		carlos.gonzalezvilla@salud.pr.gov
	Sr. Carlos López		carlos.lopez@salud.pr.gov
Órdenes de vacunas			ordenescovid19@salud.pr.gov
Distribución de vacunas			vacunascovid19@salud.pr.gov
Transferencias de vacunas en VOMS 2.0	Sra. Yameilis Ortiz		yameilis.ortiz@salud.pr.gov
	Sra. Rebecca Pérez	rebecca.perez@salud.pr.gov	
VAERS y errores en la administración de vacunas	Dra. Zaira Kianes	787-765-2929 x.3269	zaira.kianes@salud.pr.gov
	Dra. Lourdes Pedraza		lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Directorio Programa de Vacunación – Nivel Regional



Región	Nombre	Teléfono	Correo electrónico
Aguadilla	Carmen M. Ramos	787-504-4076	carramos@salud.pr.gov
Arecibo	Maribel Colón	787-504-3725	marcolon@salud.pr.gov
Bayamón	Josefina Rivera	787-504-3720	jrcoriano@salud.pr.gov
Caguas	Amalia M. Rodríguez	787-504-4282	amarodriguez@salud.pr.gov
Fajardo	Marilyn Burgos	787-504-3704	marburgos@salud.pr.gov
Mayagüez	Miriam Cruz	787-504-4281	mircruz@salud.pr.gov
Metro	Luz E. Hiraldo	787-504-3722	lhiraldo@salud.pr.gov
Ponce	María de los A. Rivera	787-504-2758	mariarivera@salud.pr.gov