



DEPARTAMENTO DE SALUD

Recomendaciones sobre intercambiabilidad y co-administración de vacunas \ COVID-19

Intercambiabilidad de los productos de vacuna contra COVID-19

06-21-2022

En general, se debe usar el mismo producto de la vacuna de ARNm para todas las dosis de la serie primaria.

En situaciones excepcionales en las que el producto de la vacuna de ARNm administrado para una dosis anterior de la serie primaria no se puede determinar o no está disponible, cualquier producto de vacuna de ARNm COVID-19 apropiado para la edad puede administrarse en un intervalo mínimo de 28 días entre las dosis para completar la serie de vacunación primaria de ARNm COVID-19.

Los niños de 6 meses a 4 años que reciben diferentes productos de ARNm para las primeras 2 dosis de una serie de vacunas de ARNm covid-19 deben seguir un programa de 3 dosis. Se debe administrar una tercera dosis de cualquiera de las vacunas de ARNm al menos 8 semanas después de la segunda dosis para completar la serie primaria de 3 dosis.

Se puede usar cualquier vacuna de ARNm apropiada para la edad para la dosis de refuerzo: puede ser la misma vacuna de ARNm que la serie primaria (refuerzo homólogo) o una vacuna de ARNm diferente (refuerzo heterólogo).

Co-administración de vacunas contra COVID-19 con otras vacunas

Las vacunas contra COVID-19 pueden administrarse sin tener en cuenta el momento de otras vacunas. Esto incluye la administración simultánea de la vacuna COVID-19 y otras vacunas el mismo día.

La amplia experiencia con vacunas no COVID 19 ha demostrado que los perfiles de inmunogenicidad y eventos adversos son generalmente similares cuando las vacunas

se administran simultáneamente que cuando se administran solas. Los datos que evalúan los resultados de la administración simultánea de vacunas contra COVID-19 con otras vacunas son limitados actualmente, incluido cualquier posible aumento de la reactogenicidad cuando la vacuna COVID-19 y otras vacunas se administran en la misma visita.

De acuerdo con mejores prácticas generales, se recomienda la administración rutinaria de todas las dosis de vacunas apropiadas para la edad simultáneamente para los niños para quienes no existen contraindicaciones específicas en el momento de la visita de atención médica. Al decidir si se coadministra otra vacuna (s) con la vacuna COVID-19, los proveedores y los padres / tutores pueden considerar si un niño está atrasado o en riesgo de retrasarse en las vacunas recomendadas y la probabilidad de que el niño regrese para otra vacuna; el riesgo del niño de infectarse con una enfermedad

prevenible por vacunación y su riesgo de enfermedad grave si se infecta; y el perfil de reactogenicidad de las vacunas.

Mejores prácticas para Administración múltiple incluyen:

Etiquetar cada jeringuilla con el nombre y la dosis (cantidad) de la vacuna, el número de lote, las iniciales del preparador y el tiempo exacto más allá del uso, si corresponde.

Administrar cada inyección en un sitio de inyección diferente; separar los sitios de inyección por 1 pulgada o más, si es posible.

Administrar la vacuna contra COVID-19 y las vacunas que pueden ser más propensas a causar una reacción local en diferentes extremidades, si es posible.