

# VACUNA COVID-19 JANSSEN

## INDICACIONES, HORARIO Y DOCUMENTACIÓN

**EDAD:** Personas de **18 años** de edad o más

**ITINERARIO:** Serie de **1 dosis**

**ADMINISTRACIÓN CON OTRAS VACUNAS:** No es recomendado al momento. Administre al menos 14 días antes o 14 días después de otras vacunas

Historial de vacunación	Y	Entonces	Siguiente dosis
Desconocido o ninguna dosis	→	Administrar Dosis 1 hoy	NO se requiere
2 dosis de una vacuna mRNA (Pfizer o Moderna)	→	→	Serie de vacunación completa. No se necesitan dosis adicionales
1 dosis de vacuna mRNA (Pfizer o Moderna)	Una serie de vacunación iniciada con una vacuna mRNA debe completarse con el mismo producto. En <b>casos extremos</b> en los que no sea posible administrar el mismo producto mRNA para completar la serie, debe esperarse un intervalo mínimo de 28 días entre una dosis de vacuna mRNA y la dosis de vacuna Janssen.		
1 dosis de una vacuna Janssen	→	→	Serie de vacunación completa. No se necesitan dosis adicionales

### Eventos Adversos

Las reacciones adversas más comunes reportadas luego de la vacunación son:

- Dolor en el sitio de la administración
- Dolor de cabeza
- Fatiga
- Dolor muscular
- Náusea
- Fiebre
- Enrojecimiento y edema en el sitio de administración

### Documentación y Reporte

Los proveedores deben documentar la administración de la vacuna en su sistema de expedientes médicos dentro de las 24 horas siguientes a la administración y deben reportar también al sistema de información de inmunizaciones (PREIS) del Departamento de Salud de Puerto Rico dentro del mismo periodo.

- En el expediente médico incluya: la fecha de vacunación, el fabricante y número de lote, la fecha en la que entregó la hoja informativa del EAU (Emergency Authorization Use), sitio y ruta de administración y nombre de la persona que administre la vacuna.
- En la tarjeta de vacunación incluya: fecha de vacunación, nombre del producto, el fabricante y número de lote, nombre/ubicación del Centro de Vacunación o profesional médico.