



Hepatitis B (Hep. B): (Edad mínima: al nacer)

Dosis al nacer: Utilizar vacuna monovalente Hepatitis B.

- **Madre HBSAg negativa:** 1 dosis en las primeras 24 horas para infantes estables con peso $\geq 2,000$ gramos. Infantes con peso $< 2,000$ gramos, administrar una dosis a la edad de 1 mes o al ser dado de alta del hospital.
- **Madre positiva al antígeno de superficie para Hepatitis B (HbsAg+):** administrar la vacuna y además inmunoglobulina Hepatitis B (HBIG) (en sitios anatómicos separados) en las primeras 12 horas de nacido. Para los infantes con peso $< 2,000$ gramos, administrar 3 dosis adicionales de la vacuna (total 4 dosis) a partir de la edad de 1 mes. A estos infantes se les debe tomar muestras para HBsAg y anti-HBsAg entre los 9 a 12 meses después de la última dosis de vacuna.
- Si no se conoce prueba de HBsAg de la madre:
 - Administrar vacuna Hep. B en las primeras 12 horas de nacido.
 - Para aquellos infantes con peso menor de 2,000 gramos, administrar además HBIG en lugar anatómico diferente en las primeras 12 horas de nacidos y administrar 3 dosis adicionales de la vacuna (total 4 dosis) a partir de la edad de 1 mes.
 - Hacer prueba a la madre y si la madre es HBsAg+, se deberá administrar HBIG a aquellos infantes que pesen 2,000 o más, tan pronto sea posible y antes de los primeros 7 días de nacido.

Serie rutina:

- Se deberá completar la serie 0, 2 y 6 meses de edad.
- Los bebés que no hayan recibido una dosis de nacimiento deben comenzar la serie tan pronto como sea factible.
- La segunda dosis será administrada a los 2 meses de edad y la tercera dosis a los 6 meses de edad.
- No es necesario vacunar a los 4 meses de edad, con excepción de aquellos infantes no vacunados al nacer.
- La tercera dosis no puede ser administrada antes de los 6 meses de edad (24 semanas), aunque la madre sea positiva al antígeno de superficie para Hepatitis B (HbsAg+).
- La administración de una cuarta dosis es aceptable cuando se utilizan vacunas combinadas luego de la primera dosis.

Situaciones especiales:

Po lo general, no se recomienda la revacunación para personas con un estado inmunológico normal que fueron vacunadas en la infancia, niños, adolescentes o adultos.

Se puede recomendar la revacunación para ciertas poblaciones, incluyendo: -Bebés nacidos de madres HBsAg positivas- Pacientes de hemodiálisis- Otras personas inmunocomprometidas.

Para obtener recomendaciones detalladas sobre la revacunación, consulte:

www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/vacc-specific/hepb.html.