



**Vacunas antimeningocócica Serogrupos A, C, W, Y: (Edad mínima: 2 meses de edad para MenACWY-CRM [Menveo®] 9 meses de edad para MenACWY-D [Menactra®], 2 años para MenACWY-D[MenQuadfi®]).**

Administrar una sola dosis a los 11-12 años, con una segunda dosis a los 16 años.

13 a 15 años no vacunados previamente; administrar 1 dosis y la segunda dosis de 16 a 18 años (intervalo mínimo de 8 semanas).

Edad 16-18 no vacunados previamente; administrar una dosis.

**Situaciones especiales:**

**Asplenia funcional o anatómica, anemia falciforme, infección VIH, Deficiencia persistente de Complemento y uso de inhibidores de complemento (Incluyendo uso de eculizumab o ravulizumab)**

**Menveo**

- Si la 1ra dosis se administra a las 8 semanas; serie de 4 dosis a los 2, 4, 6 y 12 meses.
- Si la 1ra dosis se recibe de 3-6 meses; serie de 3-4 dosis (dosis 2 [y dosis 3 si procede] al menos 8 semanas después de la dosis anterior hasta que se reciba una dosis a los 7 meses o más, seguida de una dosis adicional al menos 12 semanas después y después de los 12 meses)
- Si la 1ra dosis se recibe de 7-23 meses; 2 dosis (2da dosis por lo menos 12 semanas luego de la 1ra y luego de cumplir 12 meses).
- *Si recibe la primera dosis a los 24 meses; 2 dosis con intervalo de 8 semanas.*

**Menactra**

***Deficiencia de complemento persistente;***

- *9-23 meses; 2 dosis con intervalo de 12 semanas entre estas.*
- *24 meses o más; 2 dosis con intervalo de 8 semanas entre estas.*

**Asplenia, anemia falciforme o infección VIH:**

**9-23 meses: No se recomienda**

**≥24 meses; 2 dosis con intervalo de 8 semanas.**

**\*\* Menactra debe ser administrada por lo menos 4 semanas después de completar la serie PCV13.**

*No se recomienda Menactra en Asplenia funcional o anatómica, enfermedad de células falciformes o Infección por VIH en edad 9-23 meses.*

**MenQuadfi** - Dosis 1 a la edad de 24 meses o más: serie de 2 dosis con al menos 8 semanas de diferencia

**Estudiantes universitarios de primer año que viven en viviendas residenciales (si no se vacunó previamente a los 16 años de edad o más) o reclutas militares: 1 dosis Menveo o Menactra o MenQuadfi.**

**Vacunación adolescentes que recibieron MenACWY antes de los 10 años de edad:**

Niños para los que se recomiendan refuerzos debido a un mayor riesgo continuo de enfermedad meningocócica (por ejemplo, aquellos con deficiencia de complemento, VIH o asplenia): Para la dosis de refuerzo MenACWY

Siga el programa de refuerzo para las personas de alto riesgo ([www.cdc.gov/vaccines/hcp/aciprecs/vacc-specific/mening.html](http://www.cdc.gov/vaccines/hcp/aciprecs/vacc-specific/mening.html)).

Niños para los que no se recomiendan refuerzos (por ejemplo, aquellos que recibieron una dosis única para viajar a un país donde la enfermedad meningocócica es endémica): Administrar MenACWY de acuerdo con el calendario de adolescentes recomendado con dosis 1 a la edad de 11-12 años y dosis 2 a la edad de 11-12 años y dosis 2 a la edad 16 años.