



Virus Papiloma Humano (VPH): (Edad mínima: 9 años)

- Administrar una serie de 2 dosis de vacuna contra el VPH en un itinerario de 0, 6-12 meses a todos los adolescentes de 11-12 años. La serie de vacunación puede comenzar a la edad de 9 años.
- Administrar la vacuna contra VPH a todo adolescente de 12-18 años no vacunado previamente. El número de dosis dependerá de la edad en que se administró la primera dosis.
- Para los adolescentes de 11-14 años, se recomienda administrar 2 dosis en un itinerario de 0,6-12 meses. El intervalo mínimo entre la primera y la segunda es 4 semanas; 12 semanas entre la segunda y la tercera y, 5 meses entre la primera y la tercera dosis. Si una dosis se administra a intervalos más cortos, debería volverse a administrar cumpliendo con el intervalo mínimo luego de la dosis más reciente.
- Si se completó la serie de vacunación válida con cualquier vacuna contra el VPH, no se necesitan dosis adicionales.

Situaciones especiales:

- Personas inmunocomprometidas (incluyendo VIH), deben recibir la serie de 3 dosis, 0, 1-2, 6 meses.
- Administrar a partir de los 9 años a cualquier niño/niña con historial de abuso sexual.
- Embarazo: no se recomienda la vacunación hasta finalizar embarazo.