

# Proceso Vacunación COVID-19

DEPARTAMENTO DE  
**SALUD**




## Dosificación

- Asegúrese que la vacuna ha sido almacenada correctamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Verifique la fecha de expiración del lote y que el frasco de la vacuna sea de la presentación indicada para la edad.
- Confirme la marca de la vacuna que la persona recibió previamente en aquellos casos en que correspondan segundas dosis, dosis adicional o refuerzo. Recuerde que el refuerzo puede combinarse.
- Para la vacuna de Pfizer, diluya con la cantidad recomendada de diluyente de acuerdo con la recomendación del fabricante (1.3ml – 5- ≤12 y/o; 1.8ml- ≥12y/). Recuerde que el único diluyente autorizado es 0.9%NS, no bacteriostático.



## Registro

- Verifique la edad de la persona. En el caso de la dosis adicional y el refuerzo verifique si cumple con los criterios de la recomendación (Edad, condiciones médicas o tratamiento, tiempo desde la última dosis de la vacuna).
- Repase el cuestionario Pre-Vacunación con la persona. Identifique si el paciente puede vacunarse ese día y entregue las hojas informativas de cada Vacuna.
- Confirme la marca de la vacuna que la persona recibió previamente en aquellos casos en que correspondan segundas dosis, dosis adicional o refuerzo. Recuerde que el refuerzo puede combinarse.
- Para la dosis adicional, verifique que hayan pasado 28 días de la segunda dosis.
- Para el refuerzo, verifique que hayan pasado 2 meses si se vacunó con Janssen y 5 meses si se vacunó con Pfizer o Moderna.



## Administración

- Recuerde que esta vacuna se administra de forma intramuscular a 90°.
- Luego de la administración mantenga en observación por 15 minutos.

