



Vacunas antineumocócicas (PCV13 y PPSV23): (Edad mínima; 6 semanas para PCV13, 2 años para PPSV23) PCV13:

- Administrar una serie de 4 dosis de la vacuna PCV13 a los 2, 4 y 6 meses y a los 12-15 meses de edad.
- Administrar 1 dosis de PCV13 a niños sanos de 24 a 59 meses de edad que no están completamente vacunados para su edad.

Situaciones especiales:

- **Vacunación de las personas con condiciones de alto riesgo con PCV13 y PPSV23: Todas las dosis de PCV13 se deben administrar antes de la PPSV23 si es posible, PCV13 y PPSV23 no se administran en la misma visita.**
- **Para niños de 2 a 5 años con cualquiera de las siguientes condiciones: enfermedad crónica del corazón (enfermedad cardíaca congénita cianótica especialmente e insuficiencia cardíaca); enfermedad pulmonar crónica (incluyendo asma si se trata con terapia oral de esteroides en altas dosis); diabetes mellitus;**

2 – 5 años de edad:

- Administrar 1 dosis de PCV13 si ha recibido 3 dosis, pero no ha completado la serie.
- Si ha recibido < de 3 dosis, administrar 2 dosis de PCV13 con por lo menos 8 semanas de intervalo de separación.
- El intervalo mínimo entre dosis de PCV13 es de 8 semanas.
- Para los niños sin historial de vacunación de la PPSV23, administrar PPSV23 al menos 8 semanas después de la última dosis de PCV13.

6 a 18 años de edad:

- Niños sin historial de vacunación de la PPSV23, administrar PPSV23 al menos 8 semanas después de la última dosis de PCV13.

Fuga de líquido cefalorraquídeo; implante coclear;

2 – 5 años de edad:

- 1 dosis de PCV13 si ha recibido 3 dosis, pero no ha completado la serie.
- Si ha recibido <de 3 dosis, administrar 2 dosis de PCV13 con por lo menos 8 semanas de intervalo de separación.
- El intervalo mínimo entre dosis de PCV13 es de 8 semanas.
- Para los niños sin historial de vacunación de la PPSV23, administrar PPSV23 al menos 8 semanas después de la última dosis de PCV13.

6 a 18 años de edad:

- Niños sin historial de vacunación de PCV13 o PPSV23: Administrar 1 dosis PCV13 y 1PPSV23 con intervalo de 8 semanas de separación.
- Con PCV13, pero no PPSV23; administrar PPSV23 (intervalo de 8 semanas después de la última PCV13)
- PPSV23, pero no PCV13; administrar PCV13 (intervalo de 8 semanas)

Enfermedad de células falciformes y otras hemoglobinopatías; asplenia anatómica o funcional; inmunodeficiencias congénitas o adquiridas; infección por VIH; fallo renal crónico; síndrome nefrótico; enfermedades asociadas con tratamiento con fármacos inmunosupresores o radioterapia, incluyendo las neoplasias malignas, leucemias, linfomas y enfermedad de Hodgkin; malignidad generalizada; trasplante de órganos sólidos; o mieloma múltiple.

2 – 5 años de edad:

- 1 dosis de PCV13 si ha recibido 3 dosis, pero no ha completado la serie.
- Si ha recibido <de 3 dosis, administrar 2 dosis de PCV13 con por lo menos 8 semanas de intervalo de separación.
- El intervalo mínimo entre dosis de PCV13 es de 8 semanas.
- Para los niños sin historial de vacunación de la PPSV23, administrar PPSV23 al menos 8 semanas después de la última dosis de PCV13 y segunda dosis 5 años después

6 a 18 años de edad:

- Niños sin historial de vacunación de PCV13 o PPSV23; administrar 1 dosis PCV13 y 2 PPSV23, (1ra PPSV23 con intervalo de 8 semanas y la segunda PPSV23 5 años después).
- Con PCV13, pero no PPSV23; administrar 2 dosis PPSV23 (1ra PPSV23 con intervalo de 8 semanas y la segunda PPSV23 5 años después).
- PPSV23, pero no PCV13; administrar PCV13 (intervalo de 8 semanas). Revacunar con PPSV23 en 5 años después de la primera PPSV23 y por lo menos 8 semanas luego de PCV13.

Enfermedad Hepática crónica, alcoholismo:

6 a 18 años de edad:

- Niños sin historial de vacunación de PPSV23; administrar 1 dosis PPSV23, al menos 8 semanas después de cualquier dosis previa de PCV-13.

Una serie incompleta se define como no haber recibido todas las dosis, ya sea en la serie recomendada o en una edad apropiada para serie de 'Catch-Up'.